

Số: /UBND  
V/v Hướng dẫn chăm sóc và  
phòng trừ sâu, bệnh hại vụ Mùa  
năm 2024

Cẩm Tân, ngày 25 tháng 06 năm 2024

Kính gửi:

- Các đồng chí thành viên BCD sản xuất của xã;
- Các Ông (bà) trưởng thôn và bà con nhân dân.

Thực hiện Công văn số 1751/UBND-NN, ngày 25/6/2024 của Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Thủy về tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng vụ Thu - Mùa 2024.

Trong những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39<sup>0</sup>C; độ ẩm tương đối thấp phổ biến 45-55%. Dự báo trong thời gian tới, tiếp tục có nắng nóng gay gắt có những ngày lên đến trên 40<sup>0</sup>C; độ ẩm tương đối thấp phổ biến 45- 50%. Thời điểm hiện tại, diện tích Lúa trên địa bàn xã đã cấy xong 100%, đang ở giai đoạn bén rễ hồi xanh.

Qua kiểm tra, diễn biến sâu bệnh hại hiện nay sâu cuốn lá lúa 4, tuổi 1- tuổi 2 bắt đầu xuất hiện và gây hại, mật độ trung bình 1 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 2 con/m<sup>2</sup>; Rầy lưng trắng lúa 4 xuất hiện từ giai đoạn mạ, thời điểm hiện tại đang tuổi 2, mật độ trung bình 4-5 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 10 con/m<sup>2</sup>; Ốc brou vàng đang giai đoạn trưởng thành, gây hại chủ yếu ở giai đoạn cây – đến bén rễ hồi xanh, mật độ trung bình 5 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 12 con/m<sup>2</sup>. Bệnh nghệt rễ sinh lý gây hại cục bộ. Để đảm bảo cây Lúa khỏe từ đầu vụ, quản lý chặt chẽ các đối tượng gây hại và chủ động các biện pháp phòng trừ; UBND xã hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc và quản lý đối tượng hại như sau:

### **1. Chăm sóc lúa giai đoạn bén rễ hồi xanh**

Tiến hành bón thúc đẻ nhánh sớm, sau cấy 2-3 ngày giúp cây lúa tập trung đẻ nhánh hữu hiệu. Nên áp dụng quy trình dùng phân tổng hợp NPK (chuyên thúc) để bón cho cây lúa, hạn chế dùng phân đơn. Nếu bắt buộc bón phân đơn nên bón với lượng: đối với lúa thuần bón 6 – 7 kg đạm ure và 2 – 3 kg kali clorua; lúa lai bón 8 – 9 kg đạm ure và 2 – 3 kg kali clorua.

**Lưu ý:** Để mực nước trong ruộng 2 – 3 cm, không cho nước vào ra để tránh thất thoát dinh dưỡng.

### **2. Phòng trừ sâu, bệnh**

#### **2.1. Đối với ốc Brou vàng**

\* Biện pháp canh tác và thủ công

- Tổ chức bắt, tiêu diệt ốc trên nương dẫn nước, trước khi đưa nước và ruộng.

- Đặt lưới, phên tre chặn nương nước vào ruộng, ngăn ốc xâm nhập và bắt ốc dễ dàng. Nên đặt lưới sớm ngay từ đầu vụ đến khi thu hoạch.

- Bắt ốc và ổ trứng bằng tay vào sáng sớm hoặc chiều mát. Nên bắt ốc sớm và liên tục từ lúc cấy đến 2, 3 tuần sau.

- Đánh rãnh thoát nước (25 x 5 cm) cách nhau 10 - 15m, sử dụng thức ăn như lá khoai, rau muống... dẫn dụ ốc tập trung đến ăn để dễ thu gom bằng tay.

- Cắm các cọc tre, sậy ở những chỗ ngập nước, mương kênh tưới để thu hút ốc đến đẻ trứng và thu gom dễ dàng.

- Dùng vôi để trừ ốc bươu vàng và giúp cải tạo đất, liều dùng 25 kg/sào 500m<sup>2</sup>.

#### \* Biện pháp hóa học

- Khi mật độ ốc bươu vàng là 3 con/m<sup>2</sup>, nên khuyến cáo bà con nhân dân sử dụng một số loại thuốc như: OCRAI, NP Snailicide 7000 WP, DIOTO 250EC, Moin 6GR, Awar 700WP, Osbuvang 80 Wp.. hoặc loại thuốc có hoạt chất Niclosamide để phun trừ.

### **2.2. Sâu cuốn lá**

Dự kiến sâu non lúa 5 sẽ phát sinh, phát triển và gây hại vào khoảng 20/7 – 30/7. Vì vậy bà con nhân dân cần thường xuyên thăm đồng, nếu phát hiện sâu cuốn lá rải rác, mật độ thấp, khuyến cáo không tiến hành phun thuốc hóa học để bảo tồn thiên địch. Chỉ phun trừ sâu Cuốn lá trên những diện tích có mật độ sâu non đến ngưỡng phòng trừ (từ 50 con/m<sup>2</sup> trở lên đối với giai đoạn đẻ nhánh). Nên phun thuốc sau khi bướm nở rộ 5-7 ngày hoặc khi sâu tuổi nhỏ bằng các loại thuốc: Padan 95 SP, Pattox 95 SP, Clever 150 SC, Ammate 150 SC...

### **2.3. Rầy nâu, rầy lưng trắng**

Rầy nâu, rầy lưng trắng là loại côn trùng chích hút, gây hại nguy hiểm cho cây lúa. Cả rầy non và trưởng thành dùng miệng chích vào cây lúa để hút nhựa, làm cho cây vàng, úa, còi cọc, chết khô (gọi là hiện tượng cháy rầy), lúc đầu là từng đám, sau cháy cả vạt, có thể lan rộng ra cả ruộng và cả cánh đồng nếu không phòng trừ kịp thời. Rầy lúa 4 ra rộ từ đầu - giữa tháng 6, gây hại trên mạ mùa sớm. Lúa này mật độ thấp, không gây hại lớn chỉ tích lũy mật độ cho lúa sau. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và xử lý rầy khi có mật độ cao. Chỉ phun thuốc khi mật độ rầy đến ngưỡng 1200 – 1500 con/m<sup>2</sup>.

Phòng trừ bằng cách sử dụng luân phiên một số loại thuốc hóa học sau: thuốc có hoạt chất: Acetamiprid, Imidacloprid, Pymetrozine, Buprofezin, Cholorantraniliprole 35%... (như: Chees 50SC, Apta 300WP, Sutin 50SC, Chatot 600WG, Conphai 10WP, Prevathon 5SC ...). Ngoài ra còn có nhiều đối tượng sâu bệnh hại khác, bà con cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, phát hiện để có các biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả cao.

### **2.4. Bệnh nghệt rễ, vàng lá**

+ Bước 1: Khi phát hiện lúa bị bệnh vàng lá cần ngừng ngay việc bón phân đạm, phân NPK.

+ Bước 2: Rút nước ra khỏi ruộng để khô 2-3 ngày (nứt chân chim), sau đó đưa nước trở lại ruộng. Đối với những ruộng không rút được nước, tiến hành cào sục bùn.

+ Bước 3: Bón bổ sung phân lân dễ tiêu hoặc phân chuồng hoai mục. Có thể bón bổ sung thêm phân bón qua lá (Ưu tiên các loại phân có hàm lượng các

nguyên tố vi lượng cao như Atonik 1.8SL, Poly-feed, Humic, K-humate, Song mã, TS96, Seewead...)

+ Bước 4: Sau khi xử lý 7-10 ngày, nhổ khóm lúa lên thấy có rễ trắng mới ra, tiến hành bón thúc và chăm sóc bình thường.

**Lưu ý:** Không sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam; Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng; nồng độ, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn in trên bao bì; thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vào đúng nơi quy định.

**4 UBND xã đề nghị Công chức phụ trách Nông nghiệp, cán bộ Khuyến nông viên:** thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện, khuyến cáo người dân phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại. Tổng hợp tình hình sinh trưởng phát triển của cây lúa và các đối tượng sâu, bệnh gây hại trên các loại cây trồng báo cáo Trưởng – Phó ban chỉ đạo sản xuất của xã để có các biện pháp, giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại là điều kiện quyết định đến năng suất cây trồng. UBND đề nghị các thành viên BCD sản xuất của xã, các Ông (bà) trưởng thôn và bà con nhân dân quan tâm thực hiện tốt các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đài truyền thanh xã (đề T/t);
- Lưu: NN.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tuyên**