

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND
V/v Phòng trừ sâu, bệnh trên cây
lúa vụ mùa năm 2024.

Cẩm Tân, ngày 01 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Các đồng chí Trưởng thôn và bà con nhân dân.

Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng, hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn ôm đòng một số sâu, bệnh hại xuất hiện và gây hại cục bộ như: Sâu cuốn lá lúa 5, chủ yếu tuổi 4 – tuổi 5, mật độ 3 – 5 con/m², nơi cao 8 con/m²; sâu đục thân lúa 4, tuổi 3 – tuổi 5, tỷ lệ hại phổ biến 1 - 2%, cao 6 - 8% đánh héo; rầy lưng trắng lúa 5, chủ yếu trưởng thành – tuổi 1, mật độ phổ biến 36 – 48 con/m², cao từ 80 – 100 con/m²; bệnh Đốm nâu, Vàng lá vi khuẩn, Khô vằn, Đạo ôn tỷ lệ phổ biến 3-6%, cao 10-16%,... rải rác trên tất cả các xứ đồng... Để cây lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo mục tiêu năm 2024 toàn xã tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.900 tấn trở lên, UBND xã đề nghị các thôn và bà con nhân dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện một số biện pháp sau:

1. Đối với sâu hại

1.1. Sâu đục thân: Khi phát hiện thấy mật độ từ 2,5 – 5 % bông bạc, tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Dupont™, Prevathon® 5SC; Gànòì 95 SP; Voliam targo 063 SC; Victory 585EC; Virtako 40WG... và các thuốc khác có cùng hoạt chất đã được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

1.2. Sâu cuốn lá: Tiến hành phun trừ khi mật độ từ 10 – 20 con/m² bằng một trong số loại thuốc đặc hiệu như: Padan 95 SP, Patox 95SP, Tango 800WG, Ammate 150 SC, Dylan 2EC, Virtako 40WG, Radiant 60SC, Radiant 60SC ...

1.3. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Sẽ tiếp tục nở và gia tăng mật độ vào giai đoạn lúa trở đến chín sấp. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là các giống nhiễm để phun trừ kịp thời nơi có mật độ cao (trên 1.500con/m²) bằng các loại thuốc: Chess 50WG, Cheestar 50WG, Startcheck 755WP, Sagometro 50WG, Prevathon 5SC...

2. Đối với bệnh hại

2.1. Bệnh khô vằn: Kiểm tra và phun trừ khi bệnh mới xuất hiện bằng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin như: Validacin 5L, Vali 5SL, Vivadamy

5WP,... hoặc thuốc Nevo 330EC, Mixperfect 525SC,... phun kỹ vào vùng bệnh và các dãy lúa gần bờ kết hợp vệ sinh bờ ruộng sạch sẽ.

2.2. Bệnh đạo ôn và lem lép hạt: sẽ phát sinh và gây hại nặng giai đoạn lúa trổ - chín, cần theo dõi thời gian lúa trổ để phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa trổ 3- 5% trên tất cả các giống bằng các loại thuốc như Kamsumin, Beam 75WP, Bump 650 WP, Kasoto 200SC, Filia 525SC, Feno Super 268 WP, Sako 25WP, Vibimzol 75WP, Bemsuper 500SC, Flash 75WP,... kết hợp phun phòng bệnh lem lép hạt bằng TiltSuper 300EC, Vivil 5SC, Sagograin 300EC, AmistarTop 325SC, Mixperfect 525SC,... Phun lại lần 2 khi lúa vừa trổ xong (sau lần 1 khoảng 7- 10 ngày).

3. Chuột hại: Giai đoạn này là thời điểm chuột chủ yếu sinh sống trên đồng ruộng, chuột cái vào hang để sinh sản nên tổ chức tìm hang để đào bắt, săn bắt rất có hiệu quả (biện pháp này bắt được nhiều chuột cái và chuột con), kết hợp đặt mồi bã quanh bờ ruộng, bằng thuốc hóa học như: Gimlet 0.2GB, Racumin TP 0.75... Không nên sử dụng điện để đánh bắt chuột.

Chú ý: Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng; nồng độ, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn in trên bao bì; thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vào đúng nơi quy định. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời là điều kiện quyết định đến năng suất của cây lúa. UBND đề nghị các thôn và bà con nhân dân quan tâm thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT và các PCT UBND xã (để b/c);
- Đài truyền thanh xã (T/Tr);
- Lưu NN.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trịnh Minh Chung

